

## بررسی یافته های درمانگاهی لنگش با منشاء موضعی در گوسفندان منطقه سقز

پیمان محمدزاده<sup>۲</sup> و علیرضا نجف پور<sup>۱</sup>

(۱) متخصص جراحی دامپزشکی-استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

(۲) دانشجوی ترم آخر دوره دکترای حرفه ای دامپزشکی- عضو باشگاه پژوهشگران جوان

لنگش یکی از مهمترین معضلات گوسفند می باشد که بواسطه کاهش در تولید سبب خسارات اقتصادی به صنعت دامپروری گوسفند می شود. طی این مطالعه، در فاصله زمانی فروردین تا خرداد سال ۱۳۸۳ تعداد ۱۲۱۰۲ راس گوسفند در شهرستان سقز مورد معاینه قرار گرفت. تعداد ۷۳۸ مورد لنگش شناسایی شد و میزان شیوع آن ۵٫۲۳٪ تعیین گردید. بیماری فوت رات مهمترین عامل ایجاد لنگش با میزان ۸۸٫۴۸٪ بود. نسبت لنگش در جایگاه در طول ماههای با بارندگی زیاد، بیشتر بود. فراوانی لنگش گوسفند در منطقه سقز بالا بوده و تشخیص زود هنگام بیماریهایی که سبب لنگش در گوسفند می شوند امری حیاتی می باشد برای افزایش تولید و پیشرفت در آمد های صاحبان گوسفند، مدیریت موثر ضروری می باشد.